TERESABABARIE

ED MURELOPOUGEMMD LABELHCKUMP

BBAOMOCTAMB.

Nº 47

из в Б С Т І Я.

1. О ромскасть (или спорыный) поязвлягощихся въ рысанысть колосьясть, и бользии, происходящей отъ упо= требленія исть въ пищу въ сельбы.

(Оконганіе.)

III;

вредства отищать жльбь отврож-

А. Огищение ржаных в колосьевь отврожнось, для, употребленія, въ пищу.

Бользненные паросты: на ржаныхъ

п другихъ колосьяхъ, извъстные подъ названіемъ рожковъ, черныхъ рожковъ, бабыкъ зубовъ (по Вотячски), ужъ, частію свободно выпадають изъ колоса при мальйтемъ движеніи; но нъкоторые изъ нихъ кръпко прирастають къ колосьямъ, и такимъ образомъ при молотьбъ смътиваются съ здоровыми зернами. Выше описано употребляемое съ успъхомъ для сего средство въ Санктиетербургскомъ училищь Удъльнаго въдометва.

другое средсиво, шамъ, гдв нвшъ ввялокъ менве совершенно, но мо- жетъ быть успвшно упошребляемо при нвкоторомъ внимания. Оно со- сигоитъ въ просввания зеренъ сквозъ решето, которые отверсиня могли бы пропускать здоровыя зерна; но не рожки, которые большею частю бывають нъсколько больше здоровыхъ зеренъ. Такимъ образомъ сін послъдчин выпадають сквозь отверстія, ас

^{*} Члена Общаго Присутетвія Хозяйственнаго Денаршамента, Киязя Одоевскаго,

рожки остаются на рівнеть. Также полезно, прежде немели жлібь, вы коемъ находятся рожки, будеть смое лоть, наливать зерна водою: въ семъ случать рожки всплывають, по не наддолго, и потому должие ихъ снимать поситиво.

В Средства для отищенія хльбныхь сьмень, приготовляемыхь кь посьву, ото рожковь, и ржавгины, но не для пищи.

Замьчено, что свиена ржи, между которыми были рожки, даже просьянный, или вывыдници сохраняють вы серы своиство производищь и на другой годь такіе же рожки, особенно при благопріятетвующей ихъ образованію погодь; очевидно, что при небреженіи можно значительно усилить это бользненное свойство сымень.

Средства, употребляемыя съ усивжомь для очищения съменъ, суть слвдующия:

Беруть на каждый двейной декалитрь (около 3 тарица) зерень политру (около 3 штоф.) воды, при 4 162 Реомюра; на каждые 25 литровь (около 2 ведра) воды наливають полфунта стрной кислоты (купороснаго масла), или такое же количество кръпкаго уксуса; въ эту смъсь всылають стмена, перемъщивають ихъ, выбрасывають тъ которыя всплывуть на верхь, оставляють часъ въ покот, паконецъ сливающъ воду, а свисна вы-

Распускающь въ количесшвъ воды, достаточномъ для смочения шести двойныхъ декалитровъ (около 2½ чет.) сътенъ 4 унци сърнокислой мъди (синго купороса—sulphas cupri). Такимъ расшворомъ смачивающъ съмена предъ самыть посъвомъ; замъчено, что этощъ расшвор весьма благопріятствуеть хорошему всходу и созръванню съменъ Или;

Обрывають съмена въ тепловащой содь, и покомъ смачивають ихъ растворомъ негащеной извести въ водъ (10 функовъ извести на 5 ущатовъ холодной веды); потомъ разсылають съмена на двое сутокъ для просущеми. Или:

Смочивъ съмена тъмъ же извествовымъ растворомъ, кладутъ ихъ въ сино, чтобы смекала вода; пошомъ обсынаюмъ негащеною известню и съютъ, не давая съменамъ совершенио просохиушь *. Или:

Обливающь свиена смѣсью воды, съ одибю частію сажи и двумя частями негашеной извести. Такое приго-

^{*} При семь должно замышить, что негашеную известь надобно употреблять не слишкомь свыжую, но уже нысколько пролежавшую на воздухы, и уже распавшуюся; ибо свыжая пережженная и плошная известь слишкомь бдна, и можеть быть вредна сыменамь. Сь другой стороны разумыется, что совсымь погашеная известь, обратившаяся онять вь мыль, будеть вовсе безпелезна.

товление доставляеть съменамь прекрасное удобрение. Или:

смешивающь въ водё голубиный, или куриный навозь, вивств съ ко-ровьимь, и оставляющь въ покев лен-веро сущокь. Этимъ густымъ растворомь покрывающь съмена на 24 часа; по истечени сего времени жидкость славноть; при сенъ съмена обыкковенно ивсколько бухлупь. Въ растворъ навоза хорощо подмещивать сърчиской меди (синято кунороса).

Въ училищъ Удъльнаго въдонешва было съ услъхонь употребляене обвывание същень слабынъ растворотъ сърновислой мъди, одинъ золотнивъ купороса на фунть воды. Тапъ сдъданъ въ семъ отношения весьма удовлетворительный оныпъ: нъ колько полосъ было засъяно обмытыми въ семъ растворъ съменами, а возлъзиять одна полоса засъяна щъми ще съменави, но не обмытыми; лътомъ 1837 года въ первыхъ не оказалось ни одного ротка, послъдняя же содержала значительное количество сихъ наросторъ.

© прибосавшиоть и выпосавшиот; (съ 9-го по 16-е гисло Ноября 1840 года.

Прибыли: изъ С. Петербурга — Чиповникъ 7 класса Остенъ, Надворный Совътникъ Сипягинъ, отс. Подполковникъ Мевінсъ, Штабсъ-Капитанъ Шиманди Колленскій Секретари Петровь, изъ Горбаніова— от Подполковникъ Хвощинскій, изъ Казани— Докторъ Медицины Телье, изъ Ардатова — от С. Титулярный Совытникъ Ньмиовь, изъ Рыбинска—Чиновникъ 14 класса Бравой, остановились Кремлевской части.

Выбхали: въ Влику — Надворный Соввиникъ Сипагинд, въ Казане — Чиновичкъ 7 класса Остенд, въ Гор-башовъ — Подполковичкъ Хвощинскій, въ Арзанасъ — И горъ Графъ Штейн-бокд, въ Екашеринбургъ — Штабсъ — Калишанъ Шуманд, въ Казань — Кол-ленскій Секрешарь Петроєд, въ Сергачь — Губернскій Секрешарь Заты-кевить, въ Рыбинскъ — Чиновичкъ 14 класса Бравой.

П. ЧАСТНОЕ ИЗВЪЩЕНИЕ.

О продажет свистей.

По коммиссіи Г. Пеца продаются изъ Аптеки Эвеніуса самыя лучшія на сихъ дняхъ полученныя Стеариновыя свічи по 49 руб. ассиг. за пудъ, а фунтами по 1 руб. 25 коп. ассигнащіями—3.

Провизоръ Василій Эвеніусь.



число ноября 1840 года. З часа по подулни. В часа но подулни. В часов в в честа	Термо- право не про право про право	ci,	55,2 4,5,3. 4,2. ю. 1. 756,3. 16,7. 5,0. Тыхо	50,1. 16,7. 3,5. юв. 1. 746,7 16.8. 3,9. юз. 3. п. поиры	42,2. 16,8. 4,1. 108. 2. 741,5. 16,5. 0,8 кв. 1. пенры.	12,2, 17,8. 1,4 юз. 3. 744,4 17,3. 1,8 юз. 2. покры. покры.	37,0, 16,8 1,1. 10. 1. 739,6.17,7. 3,4. Taxo, nowper.	741,3.17,0. 0,4. з. 1. п. 743,9. 16,8. 1,0. з. 1. п. п. см. ргъ	
пабакоденія дъзанныя зік съ 10-го по 17 чис	При баро- не при баро- не пра	.04,8 3. 2. 747	754,6 15,5. 4,0. ю. 1 755,2	752,0.17,0. 3,8. юв. 3. 750 покры.	742,7. 17,0. 1,0. юв. 2. 742	41,6.17,6. 1,6. nos 3. 742 nompsi	757,0 17,3 0,6. ю. 1 п. 737	741,0.17,6 0,2. з. 1 п. 741	
M.C. L. C.	Dapowempa no Hanpan Lowo- Hanpan Low Canapa Low Canapa Low Canapa Low Canapa no Canapa	10. 746 0. 16,76,9 a, 2, 7.	1 754,5. 15,5. 4,8. 10. 1 7. T.	12 753,8. 17,3. 5,0. Tuxo 7.	13. 744,3. 16,8. 1,8. юв. 3. п. 7.	4.741,0.18,3. 1,1, no. 3. 7. morps.	15. 737,7. 17,4. 1,9. 108. 4. 7. moupper.	6. 741,0. 18,2. 0,6. Taxo 7.	

Thabuodament, Emapuniu younnem Tumnaziu, Teopsia Memeine